

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

NEO-CUTIGENOL 0,7g/100g + 400.000 I.E./100g zalf

Chloorhexidine diacetaat
Vitamine A palmitaat

Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

NEO-CUTIGENOL kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt NEO-CUTIGENOL gebruikt?
2. Wanneer mag u NEO-CUTIGENOL niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u NEO-CUTIGENOL?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u NEO-CUTIGENOL?
6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT NEO-CUTIGENOL GEBRUIKT?

NEO-CUTIGENOL is een ontsmettende en wondhelende zalf voor uitwendig gebruik. Ze bevat een ontsmettingsmiddel (chloorhexidine diacetaat) en vitamine A.

NEO-CUTIGENOL is een vette zalf. Ze is dus het meest geschikt voor droge letsels en niet voor vochtige huidaandoeningen.

NEO-CUTIGENOL wordt gebruikt bij:

- wonden, zweren en irritaties van de huid,
- brandwonden met trage wondheling,
- winterhanden of -voeten (blauwrode, pijnlijke, hevig jeukende zwellingen van tenen en/of vingers) en kloven,
- luieruitslag (luiererytheem, roodheid van de huid ter hoogte van de luier) van de pasgeborene.

2. WANNEER MAG U NEO-CUTIGENOL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u NEO-CUTIGENOL niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen die in NEO-CUTIGENOL zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met NEO-CUTIGENOL?

- Vermijd de toediening van NEO-CUTIGENOL in het gezicht, dichtbij de ogen of op de slijmvliezen. Als NEO-CUTIGENOL per ongeluk toch in de ogen of de slijmvliezen terecht zou komen, spoel dan overvloedig met water.

- Gebruik de zalf niet langer dan 7 dagen bij de behandeling van grote oppervlakten, vooral als de huid beschadigd is (bv. brandwonden) en onder een occlusief verband (verband dat de huid afsluit van de lucht).
- Niet gebruiken in het oor in geval van een doorboord trommelvlies.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast NEO-CUTIGENOL nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Er zijn echter geen wisselwerkingen bekend tussen NEO-CUTIGENOL en andere geneesmiddelen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

NEO-CUTIGENOL mag in kleine hoeveelheden worden gebruikt tijdens de zwangerschap en gedurende de borstvoeding. Wees echter voorzichtig bij de behandeling van grote oppervlakten, vooral als de huid beschadigd is (bv. brandwonden) en onder een occlusief verband (verband dat de huid afsluit van de lucht). Zie ook rubriek "*Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Neo-Cutigenol?*".

Als u gelijktijdig een ander product gebruikt dat net zoals NEO-CUTIGENOL vitamine A bevat, vraag dan uw arts of apotheker om advies, vooral tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

NEO-CUTIGENOL heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen.

Stoffen in NEO-CUTIGENOL waarmee u rekening moet houden

Butylhydroxyanisol, butylhydroxytolueen en lanoline kunnen veroorzaken:

- plaatselijke huidreacties zoals contactdermatitis (huidontsteking tengevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat),
- irritatie aan de ogen en slijmvliezen.

3. HOE GEBRUIKT U NEO-CUTIGENOL?

Gebruik NEO-CUTIGENOL altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

NEO-CUTIGENOL is een zalf voor uitwendig gebruik.

Strijk NEO-CUTIGENOL in een relatief dikke laag uit op een gaasverband en breng dit aan op het letsel.

Vernieuw het verband indien nodig: over het algemeen 1 tot 2 maal per dag.

Vermijd het gelijktijdige gebruik van NEO-CUTIGENOL met zeep.

Heeft u te veel van NEO-CUTIGENOL gebruikt?

Wanneer u te veel van NEO-CUTIGENOL heeft gebruikt of u per ongeluk NEO-CUTIGENOL heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

*Met betrekking tot de werkzame stof **chloorhexidine***

Bij plaatselijke toediening op de huid wordt er zó weinig chloorhexidine opgenomen in het lichaam dat het risico op een overdosis vrijwel onbestaande is.

Wanneer men per ongeluk chloorhexidine inneemt, wordt er slechts weinig via het spijsverteringsstelsel in het lichaam opgenomen. Daarom is het weinig waarschijnlijk dat er effecten op het lichaam zullen zijn, tenzij bij het innemen van heel grote hoeveelheden van het product.

*Met betrekking tot de werkzame stof **vitamine A***

De hoeveelheid vitamine A die opgenomen wordt in het lichaam bij plaatselijke toediening op de huid is lager dan de dagelijks aanbevolen dosis vitamine A. De kans op een vergiftiging is weinig waarschijnlijk als NEO-CUTIGENOL correct gebruikt wordt.

De hoeveelheid vitamine A in NEO-CUTIGENOL (200.000 I.E., 400.000 I.E. en 600.000 I.E. per tube van 50 g, 100 g of 150 g respectievelijk) vormt geen risico op overdosering wanneer men de zalf per ongeluk zou inslikken.

De meest voorkomende, vroege verschijnselen van een vergiftiging treden op ter hoogte van de huid: geelachtige verkleuring, roodheid van de huid, verdikking van de bovenste huidlaag, kloven, broze nagels, haaruitval. Hypervitaminose A (vergiftiging door gebruik van een te hoge dosis van vitamine A) kan bij jonge kinderen aanleiding geven tot bijvoorbeeld hoofdpijn, een gespannen fontanel bij baby's (de opening tussen de schedelbeenderen die nog moet dichtgroeien) en botpijnen. Deze symptomen zijn omkeerbaar na het stopzetten van de behandeling.

Bent u vergeten NEO-CUTIGENOL te gebruiken?

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van NEO-CUTIGENOL

Alleen te gebruiken bij klachten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van NEO-CUTIGENOL? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan NEO-CUTIGENOL bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

In zeldzame gevallen kunnen volgende bijwerkingen ter hoogte van de huid optreden:

- allergische reactie tegen chloorhexidine,
- uiterst zelden contactallergie (overgevoeligheid voor bepaalde stoffen na contact ervan met de huid) tegen vitamine A,
- huidirritatie,
- fotosensibiliteit (overgevoeligheid voor licht of zonlicht).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U NEO-CUTIGENOL?

Bewaren beneden 25°C.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik NEO-CUTIGENOL niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de tube en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in NEO-CUTIGENOL?

- De werkzame stoffen in NEO-CUTIGENOL zijn per 100 g zalf: 0,7 g chloorhexidine diacetaat en 400.000 I.E. vitamine A palmitaat.
- De andere stoffen in NEO-CUTIGENOL zijn:
 - Titaandioxide (E 171)
 - Zinkoxide
 - Levertraanolie (Type A)
 - Butylhydroxyanisole
 - Butylhydroxytolueen
 - Gele bijenwas
 - Vloeibare paraffine
 - Lanoline
 - Gele, zachte paraffine.

Hoe ziet NEO-CUTIGENOL eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Tubes van 50 g, 100 g en 150 g in gelakt aluminium.

Afleveringswijze

Geneesmiddel niet op medisch voorschrift.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Takeda Belgium
Gentsesteenweg 615
1080 Brussel

Fabrikant

Takeda GmbH
Robert-Bosch-Str.8
78224 Singen
Duitsland

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

BE185464

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 03/2013.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in 01/2014.