

**BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER****triAnal 0,25 mg / 50 mg zalf voor rectaal gebruik**

**Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.**

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u triAnal zalf voor rectaal gebruik zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 28 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

**In deze bijsluiter**

1. *Wat is triAnal zalf voor rectaal gebruik en waarvoor wordt het gebruikt?*
2. *Wat u moet weten voordat u triAnal zalf voor rectaal gebruik gebruikt*
3. *Hoe wordt triAnal zalf voor rectaal gebruik gebruikt?*
4. *Mogelijke bijwerkingen*
5. *Hoe bewaart u triAnal zalf voor rectaal gebruik?*
6. *Aanvullende informatie*

**1. Wat is triAnal zalf voor rectaal gebruik en waarvoor wordt het gebruikt?**

**triAnal zalf voor rectaal gebruik** is verkrijgbaar in tube van 20 g.

Opmerking: triAnal is ook verkrijgbaar in zetpillen.

**Famaceutische groep**

Geneesmiddel tegen aambeien.

Bevat triamcinolone (een cortisonderivaat) en lidocaïne (een plaatselijk verdovende stof).

**Aangewezen bij**

triAnal verzacht de ontsteking en de pijn bij aambeien. De zalf mag ook tegen eczeem en tegen jeuk in de anaalstreek gebruikt worden. Het optreden van aambeien kan worden vermeden door een vezelrijke voeding die darmverstopping zal tegenwerken.

**2. Wat u moet weten voordat u triAnal zalf voor rectaal gebruik gebruikt****Gebruik triAnal zalf voor rectaal gebruik niet ...**

- Bij kinderen jonger dan 12 jaar.
  - Als u overgevoelig (allergisch) bent voor de actieve bestanddelen of voor één van de andere bestanddelen van triAnal zalf.
  - Indien u zwanger bent.
  - Als u aan tuberculose of plaatselijke infecties lijdt.
- In geval van twijfel, raadpleeg uw arts of uw apotheker.

**Wees extra voorzichtig met triAnal zalf voor rectaal gebruik...**

- Reinig goed de te behandelen streek.
- Volg de voorschriften van uw arts goed op.
- In geval van anale fissuren, moet dit geneesmiddel met voorzichtigheid gebruikt worden omdat de behandeling met corticoïden de littekenvorming zou kunnen vertragen.
- Signaleer aan uw arts elke andere behandeling op basis van een derivaat van cortison die U gebruikt.
- Langdurig gebruik zou de verschijnselen van een ernstigere ziekte kunnen verbergen.

*Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek "Gebruik van triAnal zalf voor rectaal gebruik met andere geneesmiddelen." te lezen.*

*Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.*

**Gebruik van triAnal zalf voor rectaal gebruik met andere geneesmiddelen**

Het gebruik van dit geneesmiddel kan de werking van sommige andere geneesmiddelen wijzigen indien deze gelijktijdig gebruikt worden, o.a. salicylaten en ontstekingswerende middelen.

In geval van twijfel, raadpleeg uw arts of uw apotheker.

*Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.*

**Gebruik van triAnal zalf voor rectaal gebruik met voedsel en drank**

Niet van toepassing.

**Zwangerschap en borstvoeding**

Tijdens de periode van de zwangerschap wordt u aanbevolen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

*Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.*

Tijdens de periode van de borstvoeding wordt u aanbevolen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

*Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.*

**Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Zware doses van cortisonderivaten zouden geestesverwarring kunnen veroorzaken.

**Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van triAnal zalf voor rectaal gebruik**

Niet van toepassing.

**3. Hoe wordt triAnal zalf voor rectaal gebruik gebruikt?**

*Volg bij het gebruik van triAnal zalf voor rectaal gebruik nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.*

De gebruikelijke dosering is:

*Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:*

U moet de zalf 1 tot 3 maal per dag op de ontstoken plaatsen en de uitwendige aambeien toepassen.

Was zorgvuldig uw handen met zeep voor en na elke inbrenging.

Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.

De behandeling zal kortstondig zijn en de 28 dagen niet overschrijden.

**Wat u moet doen als u meer van triAnal zalf voor rectaal gebruik heeft gebruikt dan u zou mogen:**

*Wanneer u te veel van triAnal zalf voor rectaal gebruik heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).*

*Symptomen:* Een overdosering is weinig waarschijnlijk. Een langdurige behandeling met grote doses of de toepassing van de zalf op uitgestrekte oppervlakten zou de ziekteverschijnselen van overdosering kunnen doen opwekken (zwellings van het aangezicht en de hals, zenuwachtigheid, braakneiging, braken).

*Behandeling:* wanneer u per ongeluk te veel heeft toegepast moet u de behandelde streek met zeep wassen. Indien u abnormale verschijnselen vaststelt, waarschuw dan uw arts.

**Wat u moet doen wanneer u bent vergeten triAnal zalf voor rectaal gebruik te gebruiken:**

De behandeling hernemen aan de voorgeschreven dosis.

Dit vergeten zal geen ander gevolg hebben dan een vertraging van de genezing.

Neemt geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

**Als u stopt met het gebruik van triAnal zalf voor rectaal gebruik:**

Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.

**4. Mogelijke bijwerkingen**

*Zoals alle geneesmiddelen kan triAnal zalf voor rectaal gebruik bijwerkingen veroorzaken hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt*

- Zeldzame allergieën (zwellings en uitslag van de huid en van het slijmvlies op de plaats van de behandeling): stop dan de behandeling.
- Licht gevoel van branderigheid; jeuk, toename van de drang naar stoelgang en van afscheiding.
- In geval van langdurig gebruik kan het slijmvlies broos worden.
- In geval van langdurig of overmatig gebruik kunnen de stoffen een uitwerking op het hele organisme hebben.
- Vertraging van de littekenvorming.
- Stoelgangbevorderende uitwerking, maar soms ook verstoppende uitwerking.

*Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.*

**5. Hoe bewaart u triAnal zalf voor rectaal gebruik?**

Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren op kamertemperatuur (15°C - 25°C).

Gebruik triAnal zalf voor rectaal gebruik niet meer na de vervaldatum die staat vermeld achter "niet te gebruiken na" of "EXP" op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

## 6. Aanvullende informatie

### **Wat bevat triAnal zalf voor rectaal gebruik**

*De werkzame stoffen zijn:*

1 gram zalf bevat: Triamcinolonacetonid 0,25 mg – Lidocaine chloorhydraat 50 mg.

*De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:*

Polyethyleen – Vloeibare paraffine.

### **Hoe ziet triAnal zalf voor rectaal gebruik er uit en wat is de inhoud van de verpakking**

**TriAnal 0,25mg/ 50mg zalf voor rectaal gebruik** : tube van 20 g.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen**

WILL-PHARMA, Monplaisir laan 33, B-1030 Brussel.

### **Fabrikant:**

HAUPT-PHARMA Amareg GmbH, Donaustauer Strasse, 378 D-93055 Regensburg.  
UPSA laboratoires 304, av. du Dr Jean-Bru, F-47000 AGEN.

**Registratienummer:**BE047871

*Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.*

### **Afleveringswijze:**

België: vrije aflevering.

**Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in : 12/2011**