

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Bromhexine EG 8 mg tabletten Broomhexinehydrochloride

Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.

Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Waarvoor wordt Bromhexine EG gebruikt?
2. Wanneer mag u Bromhexine EG niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u Bromhexine EG in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Bromhexine EG?
6. Aanvullende informatie

1. Waarvoor wordt Bromhexine EG gebruikt?

Bromhexine EG is een mucolyticum, het maakt slijm in de luchtwegen vloeibaar.

Bromhexine EG is aangewezen voor de behandeling van aandoeningen van de luchtwegen die gepaard gaan met afscheiding van kleverig slijm:

- acute bronchitis, tracheobronchitis, chronische bronchitis;
- chronische bronchopulmonale aandoeningen;
- acute sinusitis, chronische sinusitis.

2. Wanneer mag u Bromhexine EG niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Bromhexine EG niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Niet gebruiken bij kinderen onder 2 jaar

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Bromhexine EG?

Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve dan ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?" te lezen.

Toevoeging van een vloeibaarmakend middel aan een hoeststillend middel is onlogisch.

Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gelijktijdige toediening van broomhexine en antibiotica (amoxicilline, cefuroxim, erythromycine, doxycycline) kan aanleiding geven tot een verhoging van de concentratie van antibiotica in de longen.

Gebruikt u naast Bromhexine EG nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Bromhexine werd reeds bij een groot aantal vrouwen gebruikt tijdens de zwangerschap of op vruchtbare leeftijd, zonder dat er stoornissen werden vastgesteld. Zoals voor elk geneesmiddel echter moet men de inname van Bromhexine EG vermijden gedurende de eerste 3 maanden van de zwangerschap.

Borstvoeding

Bromhexine EG vermijden tijdens de borstvoeding.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Stoffen in Bromhexine EG waarmee u rekening moet houden

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. Hoe neemt u Bromhexine EG in?

Gebruik Bromhexine EG altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Oraal gebruik. De tabletten inslikken met een kleine hoeveelheid water.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar: 1 à 2 tabletten 3 x per dag.

Kinderen van 5 tot 10 jaar: 1 tablet 3 x per dag.

Heeft u te veel van Bromhexine EG ingenomen?

Bij inname van een veel te hoge hoeveelheid kan een daling van de bloeddruk optreden. In geval van overdosering zal een symptomatische behandeling worden ingesteld.

Wanneer u te veel van Bromhexine EG heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten Bromhexine EG in te nemen?

Niet van toepassing.

Als u stopt met het innemen van Bromhexine EG

Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan Bromhexine EG bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Soms: misselijkheid, zwaartegevoel in de maag, braken, diarree, duizeligheid en hoofdpijn.

Zeer zelden: allergische reacties zoals huiduitslag of bronchospasmen, angio-oedeem (oedeem van het aangezicht, de lippen en/of de tong), anafylactische reacties

In geïsoleerde gevallen: verhoging van sommige leverenzymen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Bromhexine EG?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik Bromhexine EG niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

6. Aanvullende informatie

Welke stoffen zitten er in Bromhexine EG?

De werkzame stof in Bromhexine EG is broomhexinehydrochloride, 8 mg per tablet.

De andere stoffen zijn:

Lactose

Tarwezetmeel

Gelatine

Microkristallijn cellulose

Magnesiumstearaat

Hoe ziet Bromhexine EG eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Bromhexine EG tabletten zijn witte, platte, ronde tabletten met een breukstreep en schuin aflopende randen.

Ze zijn beschikbaar in PVC/Aluminium-blisterverpakkingen van 50 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Eurogenerics NV - Heizel Esplanade b22 - 1020 Brussel

Fabrikant

Sanico NV - Veedijk 59 - 2300 Turnhout

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE135125

Bijsluiter

Afleveringswijze: Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 02/2014