

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

HEXOMEDINE OPLOSSING 1 mg/ml OPLOSSING VOOR CUTAAN GEBRUIK

Hexamidine di-isetionaat 1 mg/ml

HEXOMEDINE TRANSDERMAAL 1,5 mg/ml OPLOSSING VOOR CUTAAN GEBRUIK

Hexamidine di-isetionaat 1,5 mg/ml

Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 tot 4 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt Hexomedine gebruikt?
2. Wanneer mag u Hexomedine niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Hexomedine?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Hexomedine?
6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT HEXOMEDINE GEBRUIKT?

Hexomedine is een ontsmettingsmiddel voor extern (uitwendig) gebruik.

Hexomedine oplossing is aangewezen bij adjuvante behandeling van de huid en van geïnfecteerde of mogelijk infecterende slijmvliezen. Hexomedine transdermaal wordt gebruikt bij de adjuvante behandeling van gelokaliseerde infecties van de huid, met name folliculitis en geïnfecteerde nagels.

2. WANNEER MAG U HEXOMEDINE NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u Hexomedine niet gebruiken?

- Als u overgevoelig (allergisch) bent voor het product of één van zijn bestanddelen.
- Voor desinfectie van de huid vóór een injectie of voor de sterilisatie van voorwerpen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Hexomedine?

- Niet gedurende lange perioden gebruiken in het bijzonder als u het onder occlusief verband gebruikt of op een beschadigde huid (vb. verbrande huid) of op de slijmvliezen of op de huid van zuigelingen.
- Vermijd contact met de ogen.
- Hexomedine transdermaal niet gebruiken op open wonden en op slijmvliezen.
- Niet langer dan 5 dagen gebruiken.
- Als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?" te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Het gelijktijdige of opeenvolgende gebruik van andere antiseptica biedt geen enkel voordeel. Gebruikt u naast Hexomedine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Over gebruik bij de zwangerschap zijn tot heden geen nadelige gevolgen bekend.

Over gebruik tijdens de borstvoeding zijn tot heden geen nadelige gevolgen bekend.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Niet van toepassing.

3. HOE GEBRUIKT U HEXOMEDINE?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hexomedine oplossing

Hexomedine oplossing zuiver, dus onverdund gebruiken, 2 tot 3 maal per dag, in lokale toediening of in een vochtig verband of bad.

Hexomedine transdermaal

Zuiver, dus onverdund gebruiken, 2 tot 3 maal per dag in een vochtig verband gedurende een half uur of in een bad gedurende enkele minuten. Het flesje is geschikt om er de geïnfecteerde vinger in te dompelen. De transdermale oplossing niet gebruiken op open wonden of op slijmvliezen, evenmin onder een occlusief verband.

Heeft u te veel van Hexomedine gebruikt?

Wanneer u te veel van Hexomedine heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, uw apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Als het product accidenteel wordt ingeslikt, wordt aanbevolen actieve kool toe te dienen en eventueel een maagspoeling uit te laten voeren. In geval het slachtoffer een onderdrukking van de ademhaling zou vertonen, moet hij of zij zo snel mogelijk naar het ziekenhuis worden overgebracht. De behandeling is symptomatisch.

Bent u vergeten Hexomedine te gebruiken?

Niet van toepassing.

Als u stopt met het gebruik van Hexomedine

Niet van toepassing.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Hexomedine bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

U kunt overgevoelig worden voor het product. Gebruik het daarom niet te veel of te lang noch op een reeds aangetaste of sterk beschadigde huid.

Overgevoeligheid aan het product kan zich uiten onder de vorm van prikkelingen, jeuk, branderigheid, droge huid. Uitzonderlijk kunnen allergische huidreacties en zelfs anafylactische reacties optreden.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiters staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U HEXOMEDINE?

Hexomedine buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 25°C.

Duur van het gebruik na opening : 15 dagen.

Als het flesje “Hexomedine transdermaal” wordt gebruikt om een geïnfecteerde vinger in te dompelen, mag het niet langer dan 5 dagen gebruikt worden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in Hexomedine ?

Hexomedine oplossing:

- De werkzame stof in dit middel is : hexamidine di-isetionaat 1 mg.
- De andere stoffen in dit middel zijn : isopropylalcohol – gezuiverd water voor 1 ml.

Hexomedine transdermaal:

- De werkzame stof in dit middel is : hexamidine di-isetionaat 1,5 mg.
- De andere stoffen in dit middel zijn : ethanol 96 % – propyleenglycol – methylal – nonoxinol 9 – gezuiverd water voor 1 ml.

Hoe ziet Hexomedine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Hexomedine oplossing: flesjes met 45 ml en met 250 ml kleurloze oplossing voor cutaan gebruik.

Hexomedine transdermaal: flesje met 45 ml kleurloze oplossing voor cutaan gebruik.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Melisana NV
Kareelovenlaan 1
B-1140 Brussel, België

Fabrikant:

Hexomedine oplossing :

Nattermann & Cie GmbH
Nattermannallee 1
D-50829 Keulen
Duitsland

Hexomedine transdermaal :
Aventis Pharma SA
Avenida de Leganes 62
ES-28925 Alcorcón
Spanje

Unither Liquid Manufacturing
1-3 Allée de la Neste
Z.I. en Sigal
31770 Colomiers
Frankrijk

Nummers van de vergunning voor het in de handel brengen

Hexomedine oplossing : BE002642
Hexomedine transdermaal : BE002466

Afleveringswijze

Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in: februari 2010.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in: 03/2014.