

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER**HEXTRIL® 0.1% mondspoeling**
hexetidine

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

Dit geneesmiddel kunt u zonder recept verkrijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

1. Wat is HEXTRIL en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u HEXTRIL gebruikt
3. Hoe wordt HEXTRIL gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u HEXTRIL
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS HEXTRIL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

HEXTRIL is een mondspoeling voor gebruik in de mond.

HEXTRIL mondspoeling bevat hexetidine, een lokaal antisepticum dat kan gebruikt worden bij de behandeling van mond- en keelbesmettingen.

Wegens zijn werking gericht tegen bacteriën en schimmels is HEXTRIL aangewezen bij:

- mondaandoeningen van infectieuze oorsprong: ontsteking van de mond en het tandvlees, ontsteking van het tandbed en wortelvlies, ettervloed.
- pijnlijke aften en andere candidosen van het mondslijmvlies (besmetting door schimmels).
- ontsmetting bij heelkundige ingrepen in de mond.

2. WANNEER MAG U HEXTRIL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN ?**Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- Bij kinderen jonger dan 3 jaar, want HEXTRIL bevat menthol.
- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor hexetidine of voor één van de andere bestanddelen van HEXTRIL.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met HEXTRIL?

- Bij langdurig gebruik. Dit is af te raden omdat het een onevenwicht van de normale microbiële flora van de mondholte kan veroorzaken. Daarom gebruikt u HEXTRIL best niet meer dan 10 dagen zonder een arts of tandarts te raadplegen.
- Elk contact met de ogen vermijden
- Enkel uitwendig gebruiken; de mondspoeling dus niet inslikken.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing. HEXTRIL wordt best gebruikt na het tandenpoetsen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. In normale gebruiksomstandigheden mag HEXTRIL aangewend worden tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

HEXTRIL heeft geen invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van HEXTRIL

HEXTRIL bevat de kleurstof azorubine (E122). Deze kan allergische reacties veroorzaken.

3. HOE WORDT HEXTRIL GEBRUIKT

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.

De gebruikelijke dosering is:

Gedurende 30 seconden de mond spoelen of gorgelen met 15 ml (= 1 soeplepel) **onverdunde** HEXTRIL of het product aanbrengen door middel van een wattenpropje gedurende 2 à 3 minuten, 2 à 3 maal per dag, of volgens het advies van de behandelende geneesheer of tandarts.

De oplossing niet inslikken maar uitspuwen na gebruik. HEXTRIL wordt best gebruikt na het tandenpoetsen.

Langdurig gebruik van HEXTRIL moet vermeden worden zonder regelmatige controle door de arts of de tandarts.

Heeft u te veel van HEXTRIL gebruikt?

Wanneer u te veel van HEXTRIL heeft gebruikt of doorgeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245).

In geval van incidentele inname van een kleine hoeveelheid, is het aangeraden een vloeibaar product tegen overtollig maagzuur in te nemen.

Een maagspoeling kan noodzakelijk blijken in geval van inname van grote hoeveelheden.

Het is weinig waarschijnlijk dat een incidentele inname een algemeen effect teweegbrengt. Irritatie van het maag-darm slijmvlies kan nochtans voorkomen.

Bent u vergeten HEXTRIL te gebruiken?

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. U zet de voorgeschreven behandeling gewoon voort.

Als u stopt met het gebruik van HEXTRIL

Geen bijzonderheden.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dit dan aan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan HEXTRIL bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Soms kunnen de volgende effecten voorkomen: allergische reactie, irritatie van de tong en de slijmvlies, verminderde gevoeligheid in de mond, smaak- en reukstoornissen.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U HEXTRIL

Bewaren beneden 25°C en beschermen tegen licht; fles bewaren in de buitenverpakking.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik HEXTRIL niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum die staat vermeld op de verpakking na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in HEXTRIL

Het werkzaam bestanddeel is hexetidine, in een hoeveelheid van 1 mg/ml.

De andere bestanddelen zijn: polysorbaat 60 – ethanol 96 % - citroenzuur monohydraat – natriumsaccharine - methylsalicylaat - kruidnagelolie – eucalyptusolie – anijsolie - levomenthol - pepermuntolie – azorubine (E 122) – gezuiverd water.

Hoe ziet HEXTRIL eruit en wat is de inhoud van de verpakking

HEXTRIL is een mondspoeling, een heldere rode vloeistof met muntsmaak, en bestaat als glazen fles van 200 ml en als PET fles van 400 ml.

HEXTRIL is vrij verkrijgbaar in de apotheek.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Johnson & Johnson Consumer NV/SA
Antwerpseweg 15-17
B-2340 Beerse

Fabrikant

Famar Orléans
5 Avenue de Concyr
F - 45071 Orléans
Frankrijk

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

HEXTRIL glazen fles 200 ml: BE062167
PET fles 400 ml: BE258526

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 05/2012.