

Module 1.3.1.3 – BE – NL	BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 Av. du Four à Briques, B-1140 Brussel	Maglid 200 mg / 200 mg orodispergeerbare tabletten
NAT/H/2622/01/IB/101 – ID 125414 PIL user testing - variation IB.C.I.z.	Pagina 1 van 4

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

MAGLID 200 MG / 200 MG ORODISPERGEERBARE TABLETTEN (smelttabletten)

Magnesiumhydroxide / Aluminiumhydroxide

Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt Maglid gebruikt?
2. Wanneer mag u Maglid niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Maglid?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Maglid?
6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT MAGLID GEBRUIKT?

De indicatie moet beperkt worden tot een kortdurende symptomatische behandeling (14 dagen) van maagzuur (pyrosis) en maagpijn.

2. WANNEER MAG U MAGLID NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?

Wanneer mag u Maglid niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- Als u een ernstige nierbeschadiging heeft.
- Bij kinderen zonder medische begeleiding.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Maglid?

- Het wordt afgeraden om dit geneesmiddel langere tijd te gebruiken (14 dagen) zonder er met uw arts over te spreken, in het bijzonder wanneer u zwanger bent.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen” te lezen.
- Dien het niet toe aan kinderen zonder uw arts te raadplegen.

Module 1.3.1.3 – BE – NL	BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 Av. du Four à Briques, B-1140 Brussel	Maglid 200 mg / 200 mg orodispergeerbare tabletten
NAT/H/2622/01/IB/101 – ID 125414 PIL user testing - variation IB.C.I.z.	Pagina 2 van 4

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Maglid nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

- Bij gelijktijdige toediening kunnen aluminium- en magnesiumhydroxiden het effect van sommige geneesmiddelen verstoren; met name anticholinergica, ketoconazol, itraconazol, barbituraten, digoxine, kinine, kinidine, warfarine, tetracyclinen, quinolonen, vitamines, fosfaten, anticoagulantia van het coumarine type, salicylaten, amfetamine en sommige sulfamiden. Het is belangrijk om een tussentijd van tenminste 2 uur in acht te nemen tussen de inname van Maglid en deze geneesmiddelen.
- Laat een tussentijd van minstens 4 uur tussen de inname van Maglid en geneesmiddelen die quinolonen bevatten.
- Gelijktijdige inname van alcohol, koffie en citroenzuur bevattende dranken, zoals fruitsap moet worden vermeden.
- Indien u een behandeling tegen maagzweren volgt (antagonist van de H₂-receptoren), gebruik dit geneesmiddel dan uitsluitend met toestemming van uw arts.

Raadpleeg in geval van twijfel uw arts of uw apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Gelijktijdige inname van alcohol, koffie en citroenzuur bevattende dranken, zoals fruitsap moet worden vermeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

- Hoge dosissen van Maglid mogen niet ingenomen worden tijdens de zwangerschap.
- Bovendien mag Maglid niet langer ingenomen worden dan twee weken tijdens de zwangerschap.
- Raadpleeg een arts voor elke herhaalde inname van Maglid langer dan twee weken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

- Aluminium verbindingen komen terecht in de moedermelk.
- Hoge dosissen van Maglid mogen niet ingenomen worden tijdens de borstvoeding.
- Bovendien mag Maglid niet langer ingenomen worden dan twee weken tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Stoffen in Maglid waarmee u rekening moet houden

Maglid bevat saccharose (suiker). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel neemt.

Module 1.3.1.3 – BE – NL	BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 Av. du Four à Briques, B-1140 Brussel	Maglid 200 mg / 200 mg orodispergeerbare tabletten
NAT/H/2622/01/IB/101 – ID 125414 PIL user testing - variation IB.C.I.z.	Pagina 3 van 4

3. HOE GEBRUIKT U MAGLID?

Gebruik Maglid altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Toedienen 1 à 2 uur na de maaltijden en bij het slapengaan.

Bij elke inname 1 of 2 tabletten gebruiken. In de regel zal men 4 tot 8 tabletten, gespreid over de dag, innemen.

In geval van maagzweer zal de dosering door uw arts bepaald kunnen worden.

Laat de tablet op de tong smelten.

Raadpleeg uw arts als de spijsverteringsproblemen langer duren dan **14 dagen**.

Heeft u te veel van Maglid ingenomen?

Wanneer u te veel van Maglid heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (**070/245.245**).

Bij inname van een overdreven hoeveelheid Maglid tabletten (de inhoud van verschillende dozen) kunnen er zich maag- en darmstoornissen voordoen.

Bij personen die lijden aan een slechte nierwerking kan er eveneens een daling van de bloeddruk of een vertraagde ademhaling en, uitzonderlijk, een bewustzijnsverlies optreden.

Indien de symptomen ernstig zijn, dan is het aangewezen om een arts te raadplegen die zal beslissen wat er verder gedaan moet worden.

Bent u vergeten Maglid in te nemen?

Niet van toepassing.

Als u stopt met het gebruik van Maglid

Niet van toepassing.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Maglid bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

- Bij personen met een verstoorde nierwerking kan magnesiumhydroxide een onderdrukking van het centrale zenuwstelsel teweegbrengen.
- Misselijkheid, braken, verstopping en diarree kunnen voorkomen. Indien deze symptomen ernstig zijn, zal men uiteraard de behandeling stopzetten en zijn arts raadplegen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Module 1.3.1.3 – BE – NL	BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS
MELISANA N.V., Kareelovenlaan 1 Av. du Four à Briques, B-1140 Brussel	Maglid 200 mg / 200 mg orodispergeerbare tabletten
NAT/H/2622/01/IB/101 – ID 125414 PIL user testing - variation IB.C.I.z.	Pagina 4 van 4

5. HOE BEWAART U MAGLID?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Gebruik Maglid niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in Maglid?

- De werkzame stoffen in Maglid zijn : magnesiumhydroxide 200 mg – aluminiumhydroxide 200 mg.
- De andere stoffen in Maglid zijn : macrogol 4000 – magnesiumstearaat – talk – etherische olie pepermunt – saccharose voor 1 tablet.

Hoe ziet Maglid eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Maglid is een geneesmiddel onder de vorm van orodispergeerbare tabletten, verpakt in dozen van 8 of 48 tabletten in een blisterverpakking.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Melisana NV
Kareelovenlaan 1
B-1140 Brussel

Fabrikant

Sanico NV
Industriezone 4 Veedijk 59
B-2300 Turnhout

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

BE156003

Afleveringswijze

Vrije aflevering.

Deze bijsluiter is goedgekeurd op 11/2011