

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS**LANSOYL PARAFFINE 78,230 g/100 g gel voor oraal gebruik**

Paraffineolie

Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 10 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt LANSOYL PARAFFINE gebruikt?
2. Wanneer mag u LANSOYL PARAFFINE niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u LANSOYL PARAFFINE?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u LANSOYL PARAFFINE?
6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT LANSOYL PARAFFINE GEBRUIKT?

Wegens zijn werking als laxermiddel is LANSOYL PARAFFINE aangewezen bij de symptomatische behandeling van constipatie (verstopping).

Waarschuwing: constipatie moet op de eerste plaats worden behandeld door een verandering van leefgewoontes en een aangepast dieet. Raadpleeg hierover uw apotheker of arts.

2. WANNEER MAG U LANSOYL PARAFFINE NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**Wanneer mag u LANSOYL PARAFFINE niet gebruiken?**

- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- Bij kinderen jonger dan 4 jaar, omdat het geneesmiddel de normale functie van de ontlastingsreflex kan belemmeren.
- Bij (intestinale) verstopping en buikpijn waarvan de oorzaak niet bekend is.
- Als u problemen heeft bij het slikken, omwille van het risico op inademing via de luchtwegen en longontsteking (lipoïde pneumopathie).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met LANSOYL PARAFFINE?

- Als u het langdurig gebruikt. Dit is af te raden zodat u niet in een situatie wordt gebracht waarbij u niet meer zonder laxermiddel kunt. Eveneens kan langdurig gebruik van LANSOYL PARAFFINE de resorptie van vetoplosbare vitamines (A, D, E en K) verminderen.
- Als u verzwakt en bedlegerig bent omwille van het risico op inademing via de luchtwegen en longontsteking (lipoïde pneumopathie). Dit risico is echter klein voor LANSOYL PARAFFINE gezien zijn voorstelling onder de vorm van een gel voor oraal gebruik.

- Als u een koolhydraatarm dieet moet volgen zult u rekening moeten houden met de concentratie sucrose: 2,12 g per soeplepel en 0,70 g per koffielepel.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Het gelijktijdig gebruik van een laxermiddel voor rectaal gebruik zoals natriumdocusaat en natriumdioctylsulfosuccinaat kan een verhoging van de opname van paraffineolie (inhoudsstof van LANSOYL PARAFFINE) veroorzaken aangezien deze laatste zal geëmulgeerd worden. Gebruikt u naast LANSOYL PARAFFINE nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Paraffineolie kan de absorptie van vetoplosbare vitamines verminderen. LANSOYL PARAFFINE neemt u het best in ongeveer 2 uur voor of na de hoofdmaaltijd en de eventuele inname van vetoplosbare vitamines.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

Tot op heden zijn er geen tegenaanwijzingen bekend voor het gebruik van LANSOYL PARAFFINE tijdens de zwangerschap bij de mens. Toch zal LANSOYL PARAFFINE enkel worden gebruikt gedurende korte periodes.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Tot op heden zijn er geen tegenaanwijzingen bekend voor het gebruik van LANSOYL PARAFFINE tijdens de borstvoeding bij de mens. Toch zal LANSOYL PARAFFINE enkel worden gebruikt gedurende korte periodes.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Niet van toepassing.

Stoffen in LANSOYL PARAFFINE waarmee u rekening moet houden

LANSOYL PARAFFINE bevat sucrose (2,12 g per soeplepel en 0,70 g per koffielepel). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus.

LANSOYL PARAFFINE bevat cochenillerood A. Deze stof kan allergische reacties veroorzaken.

3. HOE GEBRUIKT U LANSOYL PARAFFINE?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Indien er geen beterschap optreedt, raadpleeg dan uw arts opnieuw.

Volwassenen en kinderen ouder dan 14 jaar:

1 tot 3 soeplepels per dag.

Kinderen van 4 tot 14 jaar:

1 tot 3 koffielepels per dag.

Het gebruik van LANSOYL PARAFFINE wordt afgeraden bij kinderen jonger dan 4 jaar.

De inname mag in één of meerdere keren gebeuren, bij voorkeur 's morgens op de nuchtere maag, of twee uur voor of na de hoofdmaaltijd en de eventuele inname van vetoplosbare vitamines. In geval het geneesmiddel 's avonds wordt ingenomen is het aangewezen om niet te gaan liggen binnen de twee uren volgend op de inname en rekening te houden met het feit dat het effect van LANSOYL PARAFFINE pas optreedt 6 tot 8 uur na de inname.

N.B.: Laxeermiddelen dienen slechts uitzonderlijk aan kinderen toegediend te worden, daar zij de normale functie van de ontlastingsreflex kunnen belemmeren.

Langdurig gebruik van laxeermiddelen dient te worden vermeden. In geval van chronische constipatie dienen de voeding alsook de levensgewoonten te worden aangepast.

Heeft u te veel van LANSOYL PARAFFINE gebruikt?

In geval van overdosering kan vette ontlasting optreden. Gewoonlijk volstaat het om te stoppen met de behandeling om de symptomen te doen verdwijnen.

Wanneer u te veel van LANSOYL PARAFFINE heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Bent u vergeten LANSOYL PARAFFINE te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. U zet de voorgeschreven behandeling gewoon voort waarbij u erop let nooit meer dan de aanbevolen dosis te gebruiken.

Als u stopt met het gebruik van LANSOYL PARAFFINE

Alleen te gebruiken bij klachten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan LANSOYL PARAFFINE bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Het gebruik van hoge dosissen paraffineolie brengt een risico op anale lekkage mee (lekken van paraffineolie uit de anus), soms met irritatie rondom de anus, en kan in sommige gevallen een verergering van de symptomen van ontlastingsverlies (fecale incontinentie) teweegbrengen. In al deze gevallen volstaat het om de behandeling te stoppen om de symptomen te doen verdwijnen. Paraffineolie wordt zeer weinig geabsorbeerd door de slijmlaag die de binnenkant van het maagdarm kanaal bekleedt (gastro-intestinale mucus) en kan, na langdurig gebruik, aanleiding geven tot de vorming van allergische reacties (granulomateuze reacties / weefselbeschadigingen).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U LANSOYL PARAFFINE?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na de afkorting 'EXP'. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in LANSOYL PARAFFINE?

De werkzame stof in dit middel is paraffineolie in een hoeveelheid van 78,230 g/100 g.

De andere stoffen in dit middel zijn sucrose, citroenzuur monohydraat, gelatine, cochenillerood A, aromaat en gezuiverd water.

Hoe ziet LANSOYL PARAFFINE eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

LANSOYL PARAFFINE gel voor oraal gebruik is verkrijgbaar in een glazen fles van 225 g. Het is rood van kleur en smerbaar.

Afleveringswijze

Vrije aflevering.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Johnson & Johnson Consumer NV/SA

Antwerpseweg 15-17

B-2340 Beerse

Fabrikant

FARMEA

Site d'Angers

10, Rue Bouché Thomas

BP 723

F-49000 ANGERS CEDEX 01

Frankrijk

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen

BE022775_

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in augustus 2011.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in 11/2012