

## **BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS**

Zineryt 40 mg/ml / 12 mg/ml,  
poeder en oplosmiddel voor oplossing voor cutaan gebruik

erythromycine  
zinkacetaat dihydraat

Lees goed de hele bijsluiter, voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### **1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?**

Zineryt bevat het antibioticum erythromycine in de vorm van een complex met zink in een vloeistof bestaande uit alcohol en een stof met verzachtende werking op de huid. Aangewezen bij lokale behandeling van acne, meer bepaald de courante vorm van ontstoken puistknobbeltjes.

### **2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**

#### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- u bent allergisch voor erythromycine of andere antibiotica van dezelfde groep of voor een van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

#### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

- Zineryt niet in aanraking brengen met ogen of de slijmvliezen. Indien dit toch gebeurt, dan direkt met koud of lauw water gedurende enkele minuten spoelen.
- de inhoud van de fles Zineryt kan bij morsen vlekken veroorzaken op textiel of meubilair.

- als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of in het verleden geweest is.

#### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast Zineryt nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zineryt mag op de huid niet in aanraking komen met zuren of alkali.

Zineryt kan wel in combinatie met een lokale toepassing van Vitamine A-zuur, benzoylperoxide of orale toediening van tetracycline worden aangebracht.

Bij gelijktijdige toepassing van andere lokale anti-acneproducten, moet men voorzichtig zijn, aangezien de irritatie kan verergeren, in het bijzonder bij producten die afschilfering bevorderen.

#### **Waarop moet u letten met eten en drinken?**

Geen gegevens bezorgd

#### **Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding**

Zineryt kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap en de borstvoeding.

#### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Geen gegevens bezorgd

#### **Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden**

Niet van toepassing.

### **3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?**

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Zineryt 2 x per dag aanbrengen op de huid van het gehele gezicht of op andere aangedane delen (ook op de omgeving van de aangedane plaatsen), bij voorkeur na het wassen.

Uw arts zal u vertellen hoe lang u Zineryt moet gebruiken. De gebruikelijke behandelingsduur is 10 à 12 weken. In de meeste gevallen wordt dan een bevredigende verbetering waargenomen. Stop de behandeling niet voortijdig.

#### **Heeft u te veel van dit middel gebruikt?**

Wanneer u te veel van Zineryt heeft gebruikt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Een langdurig gebruik van te grote hoeveelheden Zineryt zal vermoedelijk roodheid en uitdroging van de huid tot gevolg hebben.

Bij orale inname van de gehele inhoud van één verpakking Zineryt zullen voornamelijk de toxische verschijnselen na alcohol-inname optreden.

### **Bent u vergeten dit middel te gebruiken?**

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

### **Als u stopt met het gebruik van dit middel**

Geen gegevens bezorgd.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

## **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals elk geneesmiddel kan Zineryt bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Soms kan, door de alcoholbasis in Zineryt, een branderig of prikkelend gevoel, afschilfering of een lichte roodheid op de huid worden waargenomen. Dit is van tijdelijke aard.

Overgevoeligheid en allergische reactie op een bestanddeel van Zineryt zijn mogelijk. Zineryt met de applicator aangebracht op de huid en opgedroogd veroorzaakt geen vlekken op huid of op kleding die met deze behandelde huid in contact is gekomen.

### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan .

U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem.

#### **België**

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Afdeling Vigilantie, Eurostation II

Victor Hortaplein, 40/40

B-1060 Brussel

website : [www.fagg.be](http://www.fagg.be)

e-mail: [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be)

#### **Luxemburg**

Direction de la Santé

Division de la Pharmacie et des Médicaments

Villa Louvigny – Allée Marconi

L-2120 Luxemburg

website : <http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html>

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

## **5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?**

Bewaren beneden 25°C.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles (poeder en oplosmiddel) na de vermelding EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na menging is de oplossing 8 weken houdbaar beneden 25°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

## **6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE**

### **Welke stoffen zitten er in dit middel?**

- De werkzame stoffen in dit middel zijn erythromycine en zinkacetaat dihydraat
- De andere stoffen in dit middel zijn diisopropylsebacaat en ethanol

### **Hoe ziet Zineryt eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

De verpakking bevat een fles poeder, een fles oplosmiddel en een applicator in een plastic houder. De bereiding van de oplossing wordt in bijlage beschreven. Na bereiding bevat een fles gereed produkt met applicator, 30 ml Zineryt lotion.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen**

Astellas Pharma BV  
Erasmus Park  
Square Marie Curie 50 - Gebouw 5 – 1e verdieping  
1070 Brussel

### **Fabrikant**

Astellas Pharma Europe BV  
Sylviusweg 62  
2333 BE Leiden  
Nederland

**Afleveringswijze:** Vrij verkrijgbaar.






**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:** E 6734

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in 09/2014.**

### **Bereiden van Zineryt lotion**

1. De Zineryt verpakking bevat :
  - een fles met brede hals die het poeder bevat (A)
  - een fles met smalle hals die de oplosmiddel bevat (B)
  - een applicator in een plastic houder (C)

2. Giet de oplosmiddel (B) in de fles met Zineryt poeder (A) en schroef de dop er opnieuw op.



3. Schud deze fles (A) onmiddellijk goed gedurende 1 minuut.
4. Verwijder de dop van de fles (A) en open de plastic houder van de applicator (C). Breng de houder met de applicator erin op de hals van het flesje (A) en **DRUK GOED AAN**.
5. Verwijder de plastic houder en controleer of de applicator goed vast zit. Druk zo nodig nog aan.
6. De oplossing is na bereiding 8 weken houdbaar. Schrijf de vervaldatum op het etiket.